Universidade Católica de Pelotas

Centro Politécnico

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação

PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

Prof. Dr. Wermerson D. Pereira

Universidade Católica de Pelotas

Centro Politécnico

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação

VALOR ESPERADO PARA VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

Extraído do livro: "*Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB*", Capítulo 11.

Douglas Adalberto Scheunemann

Juliano Rosinha Barboza

Outubro/2015

Revisando conceitos

Revisando conceitos

Variáveis aleatórias contínuas

- Uma variável aleatória X é contínua se existe uma função $f_x \geq 0$, tal que:

$$p_X = \int_{-\infty}^x f_x(t) \cdot dt \forall x \in IR$$

- Neste caso, X pode assumir uma quantidade não-enumerável de valores e a função p_X é chamada de função densidade de probabilidade de X .
- **Exemplos** de Variáveis Aleatórias Contínuas são: *peso, comprimento, voltagem, corrente, pressão, temperatura, tempo.*

Conceitos importantes

$$F_x = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x). dx = 1$$

Funções de densidade de probabilidade (esquerda) e função de distribuição acumulada (direita).

Determinando o valor esperado

Determinando o valor esperado

Determinando o valor esperado

- Seja uma variável aleatória contínua $\rightarrow X$;
- Com função densidade de probabilidade (PDF) conhecida $\rightarrow p(x)$;
- Definimos o valor esperado $E[X]$, também conhecido como esperança matemática ou média, pela equação:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p(x) \cdot dx$$

Determinando o valor esperado

- A interpretação de $E[X]$ para o caso contínuo é similar ao mencionado para variáveis aleatórias discretas;
- Se a variável é limitada, o cálculo é feito sem ambiguidade e a existência do valor esperado está assegurada;

Exemplo 01:

- Seja X o tempo (em minutos) durante o qual um equipamento elétrico é utilizado em carga máxima, em um certo período de tempo especificado. Então, X é uma variável aleatória contínua e sua FDP é dada por:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1500)^2} x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1500; \\ \frac{-1}{(1500)^2} (x - 3000), & \text{se } 1500 \leq x \leq 3000; \\ 0, & \text{para quaisquer outros valores.} \end{cases}$$

Exemplo 01:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1500)^2}x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1500; \\ \frac{-1}{(1500)^2}(x - 3000), & \text{se } 1500 \leq x \leq 3000; \\ 0, & \text{para quaisquer outros valores.} \end{cases}$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p(x) \cdot dx =$$

$$E[X] = \frac{1}{(1500)^2} \left[\int_0^{1500} x^2 dx - \int_{1500}^{3000} x(x - 3000) dx \right]$$

$$E[X] = 1500 \text{ minutos}$$

Exemplo 02:

- Seja a função de densidade de uma variável aleatória de X dada por:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & \text{se } 0 \leq x \leq 2; \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p(x) \cdot dx = \int_0^2 x \cdot p(x) \cdot dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2}x \cdot dx = \frac{4}{3}$$

$$E[X] = 1,33$$

Exemplo 02:

(a) PDF

(b) Typical outcomes and expected value of 1.33

Determinando o valor esperado

- No caso não limitado, podem aparecer situações indefinidas do tipo , em que pode ser afirmado o valor esperado $E[X]$ não existe;
- Assim $E[X]$ vai estar bem definido se a integral, em pelo menos um desses intervalos, for finita; isto é:

$$\int_{-\infty}^0 x \cdot p(x) \cdot dx < \infty \text{ e } \int_0^{+\infty} x \cdot p(x) \cdot dx < \infty$$

Determinando o valor esperado

Nem todas as PDFs apresentam valor esperado

Exemplo: PDF Cauchy

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \quad -\infty < x < +\infty$$

Exemplo 03:

$$E[X] = \lim_{L \rightarrow -\infty} \int_L^0 x \cdot p(x) \cdot dx + \lim_{U \rightarrow +\infty} \int_0^U x \cdot p(x) \cdot dx =$$

$$E[X] = -\infty + \infty = ?$$

(a) First 50 outcomes

(b) Sample mean

Valores esperados para importantes PDFs

importantes PDFs

Distribuição Exponencial

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p(x) \cdot dx$$

Se $X \sim \exp(\lambda)$, então:

- $p(x) = \lambda \cdot \exp(-\lambda x)$
- $x \geq 0$

$$E[X] = \int_0^{\infty} x \cdot \lambda \cdot \exp(-\lambda x) dx =$$

$$E[X] = \left[-x \cdot \exp(-\lambda x) - \frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

Outros $E[X]$ para PDFs importantes

	Values	PDF	$E[X]$
Uniform	$a < x < b$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{1}{2}(a+b)$
Exponential	$x \geq 0$	$\lambda \exp(-\lambda x)$	$\frac{1}{\lambda}$
Gaussian	$-\infty < x < \infty$	$\frac{\exp[-(1/(2\sigma^2))(x-\mu)^2]}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$	μ
Laplacian	$-\infty < x < \infty$	$\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} \exp(-\sqrt{2/\sigma^2} x)$	0
Gamma	$x \geq 0$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x)$	$\frac{\alpha}{\lambda}$
Rayleigh	$x \geq 0$	$\frac{x}{\sigma^2} \exp[-x^2/(2\sigma^2)]$	$\sqrt{\frac{\pi\sigma^2}{2}}$

Valor esperado para uma Função de Variáveis Aleatórias

de Variáveis Aleatórias

Valor esperado para um Função de V.A.

$$Y = g(X)$$

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} yp_y(y)dy$$

$E[Y]$ pode ser determinado em função de $g(x)$ como segue

$$E[Y] = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p_x(x)dx$$

Exemplo – Função Afim

$$Y = aX + b$$

$$g(x) = ax + b$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} (ax + b) p_x(x) dx$$

$$= a \int_{-\infty}^{\infty} xp_x(x) dx + b \int_{-\infty}^{\infty} p_x(x) dx$$

$$= aE[X] + b$$

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Variância e Momento para uma variável aleatória contínua

variável aleatória contínua

Variância e Momentos

Momentos:

$E[X]$ → Momento de primeira ordem (Média)

$E[X^2]$ → Momento de segunda ordem

$E[X^n]$ → Momento de ordem "n"

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xp_x(x)dx$$

$$E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n p_x(x)dx$$

Momentos centrais:

$$E[(X - E[X])^n]$$

$$\text{var}(X) = E[(X - E[x])^2]$$

Relembrando para variável discreta:

$$\text{var}(X) = \sum_i (x - E[X])^2 p_x[x_i]$$

$$\text{var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 p_x(x)dx$$

Variância Distribuição Gaussiana

$N(\mu, \sigma^2)$

$$p_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$N(0,1)$

$$\text{var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \sigma^2$$

Desvio Padrão

O desvio padrão indica o quanto os valores de uma variável aleatória estão próximos de $E[X]$.

$$\sigma = \sqrt{\text{var}(X)}$$

É comum representar critérios de aceitação em processos como função de $k \cdot \sigma$.

Exemplo para distribuição Gaussiana:

$$p = \int_{-2\sigma}^{2\sigma} p_x(x) dx = 0,6827$$

Cálculo no MATLAB

```
dp = 1; mi = 0;  
pdf = @(x) 1/sqrt(2*pi*dp^2)*...  
    exp(-(x-mi).^2./(2*dp^2));  
pr = 4*dp; % plot range  
x = -pr:2*pr/1000:pr;  
plot(x,pdf(x), 'LineWidth',2)  
n_dp = 2*dp;  
x_dp = -n_dp:2*n_dp/1000:n_dp;  
hold on; area(x_dp, pdf(x_dp));  
p_1_dp = integral(pdf,-dp,dp);  
p_2_dp = integral(pdf,-2*dp,2*dp);  
p_3_dp = integral(pdf,-3*dp,3*dp);
```

Resultados:

P_1_dp = 0,6827

P_2_dp = 0,9545

P_3_dp = 0,9973

Propriedades das principais PDFs

	Values	PDF	$E[X]$	$\text{var}(X)$	$\phi_X(\omega)$
Uniform	$a < x < b$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{1}{2}(a+b)$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{\exp(j\omega b) - \exp(j\omega a)}{j\omega(b-a)}$
Exponential	$x \geq 0$	$\lambda \exp(-\lambda x)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - j\omega}$
Gaussian	$-\infty < x < \infty$	$\frac{\exp[-(1/(2\sigma^2))(x-\mu)^2]}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$	μ	σ^2	$\exp[j\omega\mu - \sigma^2\omega^2/2]$
Laplacian	$-\infty < x < \infty$	$\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} \exp(-\sqrt{2/\sigma^2} x)$	0	σ^2	$\frac{2/\sigma^2}{\omega^2 + 2/\sigma^2}$
Gamma	$x \geq 0$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x)$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	$\frac{1}{(1 - j\omega/\lambda)^\alpha}$
Rayleigh	$x \geq 0$	$\frac{x}{\sigma^2} \exp[-x^2/(2\sigma^2)]$	$\sqrt{\frac{\pi\sigma^2}{2}}$	$(2 - \pi/2)\sigma^2$	[Johnson et al 1994]

Funções características

Funções características

Funções Características

- Como visto no capítulo que abordou Variáveis Aleatórias Discretas, a função característica é uma valiosa ferramenta para o cálculo dos momentos, por simplificação matemática.

$$\phi_X(\mathbf{w}) = E[\exp(j\omega X)]$$

- A função característica sempre existe, mesmo que os momentos de uma determinada PDF não.

Funções Características

- Para uma variável aleatória contínua, a função característica é obtida a partir de:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot p(x) \cdot dx$$

- Para as partes reais e imaginária de $E[\exp(j\omega x)]$, que são:

→ REAL: $E[\cos(\omega X)]$

→ IMAGINÁRIA: $E[\sin(\omega X)]$

Funções Características

- Resultando em:

$$\phi_X = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \cdot \exp(j\omega x) \cdot dx$$

- A função característica é vista como a transformada de Fourier da PDF, embora com um $+j$ na definição, em oposição ao $-j$ (mais comum).

Funções Características

- Uma vez que a função característica tenha sido encontrada, os momentos são dados através da fórmula:

$$E[X^n] = \frac{1}{j^n} \frac{d^n \phi_X(\omega)}{d\omega^n}, \omega = 0$$

Exemplo:

- Utilizando a definição da PDF exponencial:

$$\begin{aligned}\Phi_X(\omega) &= \int_0^{+\infty} \lambda \cdot \exp(-\lambda x) \exp(j\omega x) \cdot dx \\ &= \int_0^{+\infty} \lambda \cdot \exp[-(\lambda - j\omega)x] \cdot dx\end{aligned}$$

$$\Phi_X(\omega) = \lambda \frac{\exp[-(\lambda - j\omega)x] \Big|_0^{\infty}}{-(\lambda - j\omega)}$$

- Considerando:
 - $\lambda > 0$;
 - $\exp[-(\lambda - j\omega)x] \rightarrow 0$, se $x \rightarrow \infty$, obtém-se:

Funções Características

$$\phi_X(\omega) = \frac{\lambda}{\lambda - j\omega}$$

- Calculando o momento:

$$E[X^n] = \frac{1}{j^n} \frac{d^n \phi_X(\omega)}{d\omega^n}, \omega = 0$$

$$E[X^n] = \lambda n! (\lambda - j\omega)^{-n-1}, \omega = 0$$

$$E[X^n] = \frac{n!}{\lambda^n}$$

Funções Características

Fórmula momento só é válida se existirem momentos de ordem superior.

Funções Características

- Só porque uma PDF tem sua função característica, e todas têm, não significa que o valor médio exista;
- Portanto, não existindo a média, não existirão todos os momentos de ordem superior.

Exemplo: PDF Cauchy

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \quad -\infty < x < +\infty$$

Funções Características

- A função característica tem quase as mesmas propriedades que um aleatória discreta variável:
 1. A função característica sempre existe;
 2. A PDF pode ser recuperada a partir da função característica de Fourier inversa que neste caso é:

$$p_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_X(\omega) \exp(-j\omega x) d\omega$$

Funções Características

3. Convergência de uma sequência de funções características $\phi^{(n)}(\omega)$ para $n = 1, 2, \dots$ dada por uma função característica $\phi(\omega)$ garante que a sequência correspondente de PDFs $p^{(n)}(x)$ para $n = 1, 2, \dots$ convirja para $p(x)$ dado por:

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\omega) \exp(-j\omega x) d\omega$$

Probabilidade, Momento e a Desigualdade de Chebyshev

Περίληψη και σημειώσεις

Desigualdade de Chebyshev

Utilizada para determinar a probabilidade máxima “B” para uma variável aleatória assumir valores $E[X] \pm \gamma$.

Sua principal vantagem é que não é necessário conhecer a PDF, apenas a variância e a média.

$$P[|X - E[X]| > \gamma] \leq B \qquad P[|X - E[X]| > \gamma] \leq \frac{\text{var}(X)}{\gamma^2}$$

Estimando a Média e a Variância

Estimando a Média e a Variância

Média e Variância

- A média e a variância para variáveis aleatórias contínuas são estimadas exatamente da mesma forma que é feita para variáveis aleatórias discretas.
- Para **M** realizações $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_M\}$ de uma variável aleatória **X**, temos:

Média e Variância

- Média:

$$\widehat{E[X]} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i$$

- Variância:

$$\text{var}(X) = \widehat{E[X^2]} - (\widehat{E[X]})^2$$

$$\text{var}(X) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i^2 - \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i \right)^2$$

Universidade Católica de Pelotas

Centro Politécnico

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação

VALOR ESPERADO PARA VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

Extraído do livro: "*Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB*", Capítulo 11.

Douglas Adalberto Scheunemann

Juliano Rosinha Barboza

Outubro/2015